

# ¿Qué medicamentos debo y no debo tomar antes de la operación?

## Anticoagulantes

Los anticoagulantes pueden ser necesarios para algunas cirugías.

Plavix (clopidogrel)	Effient
Coumadin (warfarina)	Xarelto
Eliquis	Aspirina
Brilinta	

Si toma un anticoagulante, hable con su cirujano para saber si le gustaría que lo **SUSPENDA**. Si es así, consulte al médico que se lo recetó (normalmente el médico de cabecera o el cardiólogo), que le dirá si es seguro dejar de tomar el anticoagulante, durante cuánto tiempo y cuándo debe volver a tomarlo.

## Medicamentos para la tensión arterial

Si está tomando medicamentos para controlar su presión arterial, por favor **CONTINÚE** tomándolos sin interrupción. Si debe tomar medicamentos para la tensión arterial la mañana de la intervención, tómelos con un pequeño sorbo de agua.

## Medicamentos para la deficit de atención

Por favor, **NO TOME** sus medicamentos para el TDAH/ADD el día de la cirugía.

## Inhaladores y medicamentos para la alergia estacional

Si usted usa un Inhalador, por favor **CONTINÚE** usándolo como lo hace normalmente. Si tiene un "Inhalador de Rescate", TRAIGALO al Centro Quirúrgico de Waterbury cuando venga. Si está tomando un medicamento para la alergia estacional, puede **TOMARLO** el día de la cirugía con *un pequeño sorbo de agua*.

## Diabetes/Medicamentos para adelgazar/Fentermina

Los medicamentos orales para la diabetes **NO DEBEN TOMARSE** el día de la cirugía. Puede reanudarlos después de la cirugía cuando vuelva a comer.

Los usuarios de bombas de insulina **DEBEN SEGUIR** utilizándolas, pero deben **REDUCIR** su dosis la noche anterior y el día de la cirugía, cuando no estén comiendo. Los pacientes que se administran insulina inyectable también deben **REDUCIR** la dosis la noche anterior. Pregunte a su médico qué dosis debe tomar la noche anterior a la intervención. Si no puede ponerse en contacto con su médico de cabecera puede llamar al WSC y pedir hablar con Anestesia.

Los medicamentos inyectables para la pérdida de peso/GLP-1/diabetes **DEBEN SUSPENDERSE** antes de la cirugía.

Wegovy	Saxenda	Ozempic
Rybelsus	Mounjaro	Bydureon
Trulicity	Tanzeum	Victoza
Byetta		

**NO DEBE TOMAR** estos medicamentos durante una semana antes de la intervención quirúrgica porque pueden hacer que los alimentos salgan del estómago más lentamente. *Seguir tomando estos medicamentos aumenta el riesgo de vómitos y aspiración durante la anestesia*. Si usted toma cualquiera de estos medicamentos, por favor, **SUSPENDA la dosis durante una semana** y tome **LÍQUIDOS CLAROS SÓLO EL DÍA ANTES** de la cirugía para reducir la cantidad de alimentos que pueden estar todavía en su estómago el día de la cirugía.

La **FENTERMINA** **NO DEBE tomarse durante una semana antes** de la cirugía. Tomar este medicamento hace que la presión sanguínea baje peligrosamente durante la anestesia. Su cirugía **PUEDA SER CANCELADA** si su dosis de Fentermina es demasiado cercana al momento de la cirugía.